

Protocol Bijensteek

Hoe imker en bezoeker moeten handelen bij een bijensteek en ongewone reacties (1-3% van de gestoken personen)

1. Verwijder de angel zo snel mogelijk. (krabben, schuiven)
2. Vertel altijd dat je gestoken bent; blijf rustig
3. Blijf in het zicht van de anderen; de anderen moeten degene die gestoken is blijven observeren
4. Ken de verschijnselen van de reacties (z.o.z.); neem de klachten serieus
5. Bij klachten I-II naar de huisarts, waarbij de betrokkene niet zelf mag rijden. Eventueel anti-histaminicum tabletten gebruiken (bv. Cetirizine)
6. Bij klachten III-IV spoedeisende hulp (112) bellen; Als levensgevaar dreigt altijd injectie via EpiPen geven en dit melden bij het inroepen van spoedeisende hulp en aan medische hulpverlener
7. Doe aan voorzorg door te beschikken over mobiele telefoon, adres bijenstal, aanwezigheid ter plaatse van anti-histamine tabletten om lokale zwellingen te voorkomen.
8. 112 bellen:

Je krijgt de meldkamer van de politie aan de lijn	Noem verblijfplaats en vraag ambulancedienst
Wacht tot je wordt doorverbonden met de ambulancedienst	Noem je naam, vertel van een allergische reactie op bijensteek, wat al gedaan is (EpiPen gebruikt), de plaats en hoe die te bereiken, ingang waar men wordt opgewacht.

Reacties op een bijensteek

Indeling op ernst van de reactie (graden van Muller), met de bijbehorende verschijnselen en behandeling.

I-IV treden binnen korte tijd op: 1 minuut-1 uur.

0	Zwelling op plaats van de steek (large local). Kan zelfs na een dag nog optreden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lokale jeuk ▪ lokale roodheid en/of ▪ lokale zwellingen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antihistamine
I	Huidverschijnselen over het hele lichaam:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ galbulten, netelroos ▪ jeuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antihistamine ▪ Naar de huisarts ▪ Prednison
II	Algehele roodheid, zwellingen en maag-darm verschijnselen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwellingen op andere plaatsen ▪ darmklachten: buikpijn, misselijkheid, braken, diarree 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antihistamine ▪ Naar de huisarts ▪ Prednison
III	Ademhalings-verschijnselen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ benauwdheid: piepende ademhaling, hees, dichtgeknepen keel, kortademig ▪ sufheid, flauwvallen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 112 bellen ▪ Bij levensgevaar EpiPen gebruiken
IV	Vasculaire aandoeningen, anafylactische shock	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hartkloppingen ▪ pijn op de borst ▪ bloeddrukdaling ▪ urine verlies ▪ blauwe handen/voeten ▪ bewusteloosheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 112 bellen ▪ Bij levensgevaar EpiPen gebruiken